



HELIO BIOMARINE Zn

FICHA TÉCNICA // Última actualización
07.05.2025

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Helio Biomarine		(p/v)
Zinc	(Zn)	22.0%
L-α Aminoácidos		15.0%
Aceites ricos en Omega-3		16.8%
Micronutrientes		6.5%
Vitamina B1		1.5%
Enzimas, otras vitaminas, etc.		0.02%
Nitrógeno	(N)	1.0%
Fosforo	P ₂ O ₅	0.6%
Potasio	K ₂ O	0.1%
Materia orgánica en solución	NO ₃ CO ₃	36.0%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	Marrón
Olor	Ligero olor a especies marinas
Reactividad con el material del envase	Estable
pH	2.5
Solubilidad en agua	100% soluble
Densidad	1.24

FORMULACIÓN

Líquido concentrado

MODO DE ACCIÓN

Absorción foliar y radicular

CLASE

Nutrición

HELIOPOTASSE LATAM S.A.C - R.U.C 20609199718
SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERÚ.

DESCRIPCIÓN

HELIO BIOMARINE Zn es un producto bioinorgánico que previene y corrige las deficiencias de Zinc en los momentos de máxima actividad vegetativa y reproductiva, desde el brotamiento hasta la fructificación, recuperando y estimulando el crecimiento y desarrollo de la planta. Esta formulado con L- α aminoácidos naturales que actúan como quelatos que optimizan la asimilación de los nutrientes.

DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar:

	Cultivo	Momento de aplicación	Dosis	
			(L/ha/aplic.)	(L/ cil)
Industriales	Café, caña de azúcar, cacao, palmito.	Aplicar al inicio de la primera brotación y al inicio de la segunda brotación.	1 – 1.5	500 ml
	Olivo	1° al inicio del brotamiento. 2° al inicio de la floración.		
	Algodón	Aplicar después del desahije.		
	Espárrago	Aplicar al 1° brotamiento. Repetir al 2° y 3° brotamiento.		
Hortalizas	Lechuga, rocoto sandía, maca, apio, aji, nabo, pimiento, poro, acelga, espinaca, melón, col, culantro, zanahoria, betarraga, rabanito, albahaca, zapallo, caigua, coliflor, pepinillo, calabazas, brócoli.	Aplicar 20 días después del trasplante, o emergencia repetir la aplicación 15 a 20 días después.		
	Cebolla, ajo.	1° 30 días después del trasplante. 2° al inicio del bulbeo.		
	Páprika.	1° 30 días después del trasplante. 2° repetir 30 días después.		
	Papa, tomate.	1° 30 días después dela siembra. 2° en el aporque. 3° al inicio de la floración.		
	Fríjol, vainita, arveja, haba, soya, maní, pallar, garbanzo.	1°: 20 días después de la siembra. 2° repetir a los 15 días.		
Cereales	Maíz, arroz, trigo, cebada.	1°: 20 días después de la siembra. 2° repetir a los 15 días.		
Frutales	Cítricos, granado, manzano, fresa, piña,	1° al inicio del brotamiento. 2° al inicio de la floración.		

	durazno, higo, plátano, pera, ciruelo, papayo, lima, palto, arándano.		
	Vid.	Aplicar con 5-10 cm de longitud de brotes.	

Aplicación al suelo:

HELIO BIOMARINE Zn se puede aplicar al suelo vía riego tecnificado, a dosis de 2-3 L/ha

COMPATIBILIDAD

HELIO BIOMARINE Zn es compatible con la mayoría de los pesticidas. Puede aplicarse solo o en mezcla con abonos y productos fitosanitarios normalmente utilizados. Se recomienda hacer una pequeña prueba de compatibilidad antes de usar. HELIO BIOMARINE Zn no es fitotóxico, puede ser usado en todos los cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar bajo sombra, en un lugar limpio, seco y ventilado.
- Cuidar de no contaminar el suministro de agua, los materiales de manejo y de almacenamiento, limpieza adecuada del equipo y eliminación de desechos.
- Para más información referirse al MSDS del producto.

PRESENTACIÓN

1L, 4L, 20L y 80L.

ORIGEN

Perú.